L'Art du Rien :

Exploration des Mystères du Vide ...

L'Art du Rien :

Exploration des Mystères du Vide ...

Partie I : Introduction => Compléments

2. Définition du vide

2.2. Les conditions nécessaires pour le vide

Le vide est possible lorsque l'on a un domaine de l'état gazeux à une pression inférieure à la pression dite « normale* ».

Pour ce faire, il faut :

- De la matière à l'état gazeux
- Des « limites » (ex. : des parois solides, les limites de l'atmosphère terrestre)
- Une référence de pression dite « normale* »

sur Terre
1013hPa @ 25°C

sur Vénus
90 000 hPa @ 450°C

sur Mars
70 hPa @ -60°C

sur la Lune
1 nPa @ -18°C

I. Le vide à travers l'histoire

○ 17^{ème} siècle :

➤ L'expérience des hémisphères de Magdebourg.

=> Force nécessaire pour séparer les sphères :

~ 20 000 Newtons ⇔ ~ 2 tonnes

Otto von Guericke

$$(F = \pi r^2 \Delta P)$$

où

- ΔP (Pa) est la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la sphère,
- r est le diamètre de la sphère (m).

Expérience des hémisphères de Magdebourg

Diamètre ~ 40 à 50 cm

L'Art du Rien :

Exploration des Mystères du Vide ...

Partie 2 : Le concept scientifique du vide
et ses applications

L'Art du Rien : Exploration des Mystères du Vide ...

Partie 2 : Le concept scientifique du vide et ses applications

- I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »
 - La pression
 - La densité moléculaire
 - Le libre parcours moyen
 - Le vide qui n'est pas si vide...

- II. Pourquoi faire le vide?
 - Des exemples d'applications

Satellite

Nanotube de carbone

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

Le vide est possible lorsque l'on a un domaine de l'état gazeux à une pression inférieure à la pression dite « normale ».

« L'échelle du vide »

Rappel :

Autres unités :

1 Pascal (Pa) = 1 N.m⁻²

1 Torr / mmHg = 1,33.10² Pa

1 micron de mercure (μHg) = 0,133 Pa

1 mbar / hPa = 100 Pa

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Pour caractériser le vide, la grandeur utilisée est la pression :

$$P = \frac{F}{S}$$

Où

P est la pression en N/m² ou en Pa (Pascal)

F est la force en N (Newton)

S est la surface sur laquelle la force est appliquée en m²

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Pour caractériser le vide, la grandeur utilisée est la pression :

$$P = \frac{F}{S}$$

Où

P est la pression en N/m² ou en Pa (Pascal)

F est la force en N (Newton)

S est la surface sur laquelle la force est appliquée en m²

- Nécessite une déformation / un mouvement « perceptible »

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Pour caractériser le vide, la grandeur utilisée est la pression :

$$P = \frac{F}{S}$$

Où

P est la pression en N/m^2 ou en Pa (Pascal)

F est la force en N (Newton)

S est la surface sur laquelle la force est appliquée en m^2

- Nécessite une déformation / un mouvement « perceptible »

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Pour caractériser le vide, la grandeur utilisée est la pression :

$$P = \frac{F}{S}$$

Où

P est la pression en N/m² ou en Pa (Pascal)

F est la force en N (Newton)

S est la surface sur laquelle la force est appliquée en m²

- Nécessite une déformation / un mouvement « perceptible »
- À faibles pressions (=> déformation faible), utilisation de mesures indirectes
 - ↳ Nécessité d'autres grandeurs de quantification « *Equivalent au Pa* », permettant d'exprimer la pression.

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- De quoi est constitué le vide?

Le vide peut être considéré comme une population de molécules, en agitation thermique, enfermées par des parois.

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- De quoi est constitué le vide?

- Loi de Dalton (1801)

Loi de thermodynamique énonçant que la pression au sein d'un mélange de gaz parfaits est égale à la somme des pressions partielles de ses constituants.

John Dalton

Composition de l'air

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- De quoi est constitué le vide?

- Loi de Dalton (1801)

Loi de thermodynamique énonçant que la pression au sein d'un mélange de gaz parfaits est égale à la somme des pressions partielles de ses constituants.

John Dalton

Composition de l'air

Illustration de la loi de Dalton en utilisant les gaz de l'air ambiant

$$\text{Loi de Dalton : } P_{\text{totale}} = \sum P_{\text{partielles}}$$

(Par Andrew Jarvis — source Wikipédia)

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- De quoi est constitué le vide?
 - Composition du vide en fonction de la pression (hors procédé)

Pression atmosphérique

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

○ Hypothèse d'Avogadro : (1811)

Dans des conditions identiques de pression et de température, un même volume de gaz quelconque contient le même nombre de molécules.

Dans les conditions dites normales ($P = 760 \text{ mmHg}$ / $T = 0^\circ\text{C}$), une mole (quantité de matière d'un système) occupe 22,4L et contient $\mathcal{N}^\circ = 6,02 \cdot 10^{23}$ molécules.

Dans 1 cm^3 , il y a :

- $2,69 \cdot 10^{19}$ molécules / cm^3 , à la pression atmosphérique,

- $2,66 \cdot 10^{10}$ molécules / cm^3 , à 10^{-6} mbar .

○ Loi fondamentale des gaz parfaits

À basse pression, un gaz réel se comporte comme un gaz parfait.

$$P.V = n.R.T$$

Avec

P : pression (Pa)

V : volume de gaz (m^3)

T : température absolue (K)

n : nombre de molécules (mol)

R : constante des gaz parfaits ($\sim 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)

Amedeo Avogadro

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- La densité moléculaire :
C'est le nombre de molécules par unité de volume.

Vide primaire

Vide secondaire

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- La densité moléculaire :
C'est le nombre de molécules par unité de volume.

Vide primaire

Vide secondaire

On peut définir la densité moléculaire, à partir de la loi des gaz parfaits, comme suit :

$$\text{Densité moléculaire } n_v = \frac{P}{k \cdot T}$$

Avec P : la pression (Pa)

T : la température (K)

k : constante de Boltzmann

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- La densité moléculaire :

Densité moléculaire
mol/cm³
@ t° ambiante

Pression
hPa, mbar

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Le libre parcours moyen λ :

C'est la distance moyenne que peut parcourir une molécule avant de heurter un obstacle

Vide primaire

Vide secondaire

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Le libre parcours moyen λ :

C'est la distance moyenne que peut parcourir une molécule avant de heurter un obstacle

Vide primaire

Vide secondaire

On peut définir le libre parcours moyen comme suit :

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \pi \cdot D_0^2 \cdot n_v}$$

Avec D_0 : diamètre moléculaire

n_v : densité moléculaire

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Le libre parcours moyen :

Densité moléculaire
mol/cm³
@ t° ambiante

Libre parcours moyen
(azote)

Pression
hPa, mbar

Vide primaire

Vide secondaire

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- La densité moléculaire & le libre parcours moyen :

Vide primaire

Vide secondaire

Les chocs entre molécules dominent.
(assimilable à un mouvement brownien)

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- La densité moléculaire & le libre parcours moyen :

Vide primaire

Vide secondaire

Les chocs entre molécules dominant.
(assimilable à un mouvement brownien)

- => Description mathématique du mouvement aléatoire d'une « grosse » particule immergée dans un liquide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les « petites » molécule
- entre deux chocs, la grosse particule se déplace en ligne droite avec une vitesse constante ;
 - la grosse particule est accélérée lorsqu'elle rencontre une molécule de fluide ou une paroi.

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- La densité moléculaire & le libre parcours moyen :

Vide primaire

Vide secondaire

Les chocs entre molécules dominant.
(assimilable à un mouvement brownien)

Les chocs molécules - paroi dominant.

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Les régimes d'écoulement gazeux :
Selon la variation de pression et les caractéristiques du système (*diamètre du conduit*), il peut y avoir différents types d'écoulements possibles :

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Les régimes d'écoulement gazeux :

**Régime
visqueux**

**Régime
intermédiaire**

Régime moléculaire

Une foule quittant une salle de spectacle

- *bousculade = régime (visqueux) turbulent*
- *sortie compacte ordonnées = régime (visqueux) laminaire*
- *contre-sens difficile mais possible = régime intermédiaire*
- *spectateurs isolés perdus = régime moléculaire*

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Les régimes d'écoulement gazeux :
 - Le régime visqueux

Le gaz se comporte comme un fluide, composé de couches concentriques. Il y a frottement entre ces "couches", avec entrainement et freinage réciproque (viscosité du fluide).

- ✓ *Écoulement laminaire = succession de couches concentriques (Vitesse nulle au niveau des parois, vitesse maximale au milieu du conduit)*
- ✓ *Écoulement turbulent = apparition de tourbillons (temporaire ou permanent, risque de cavitation)*

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Les régimes d'écoulement gazeux :
 - Le régime moléculaire

Il n'y a plus d'interactions molécule-molécule. Les chocs contre les parois dominant.

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Les régimes d'écoulement gazeux :
 - Le régime moléculaire

Il n'y a plus d'interactions molécule-molécule. Les chocs contre les parois dominant.

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Les régimes d'écoulement gazeux :
 - Le régime moléculaire

Il n'y a plus d'interactions molécule-molécule. Les chocs contre les parois dominant.

- ✓ *Le choc molécule-paroi se décompose en 3 temps : collage, temps de séjour et décollage,*
- ✓ *Il n'y a pas de relation entre la direction d'incidence et celle de départ.*

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Les régimes d'écoulement gazeux :
 - Le régime moléculaire

- ✓ Pas d'interaction entre molécules
- ✓ Pas de viscosité
- ✓ Pas d'effet mémoire (direction d'origine)

- ✓ Le passage de P_2 vers P_1 est régi par des lois de probabilité, et plus par un effet d'entraînement et de mouvement d'ensemble
- ✓ Une circulation à double sens est possible et effective, mais il y a plus de molécules allant de A vers B que de B vers A.

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

- Les régimes d'écoulement gazeux :
 - Le régime intermédiaire

On passe progressivement :

- ✓ *du régime visqueux au régime moléculaire,*
- ✓ *d'un mouvement d'ensemble avec frottements entre "couches" de gaz à des chocs individuels entre molécules et contre les parois.*

$$d < \lambda < 20 \cdot d$$

avec :
 λ = libre parcours moyen
 d = diamètre du conduit

I. Les grandeurs physiques qui entrent « en jeu »

En résumé :

II. Les applications

II. Les applications

L'Art du Rien : Exploration des Mystères du Vide ...

A suivre :

- Partie 3 : Créer et contrôler le vide
 - ⊖ Créer le vide
 - Comment fait-on?
 - ⊖ Contrôler le vide
 - Comment mesurer?
 - ⊖ Les évolutions technologiques pour créer et mesurer le vide